

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Elocon, 1 mg/g kreem
Elocon, 1 mg/g salv
Elocon, 1 mg/g nahalahus
Mometasoonfuroaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsisemaks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Elocon ja milleks seda kasutatakse
2. Mida on vaja teada enne Elocon'i kasutamist
3. Kuidas Elocon'i kasutada
4. Võimalikud kõrvaltoimed
5. Kuidas Elocon'i säilitada
6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ELOCON JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Elocon on kortisooni-tüüpi hormooni sisaldav ravim nahal kasutamiseks, mille toimeaine kuulub tugeva toimega glükokortikosteroidide klassi.

Näidustused:

Dermatiidi, ekseemi või psoriaasi sümptomaatiline ravi.

Elocon kreem ja salv on näidustatud mometasoonfuroaadile alluvate põletikuliste nahahaiguste paikseks raviks, nagu psoriaas, atoopiline dermatiit ja ärritus- ja/või allergiline kontaktdermatiit.

Nahalahus on eriti sobiv mometasoonfuroaadile alluvate nahahaiguste paikseks raviks karvadega kaetud nahal, nt psoriaas peanahal.

Kasutage ainult arsti ettekirjutusel.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ELOCON'I KASUTAMIST

Ärge kasutage Elocon'i

- kui te olete allergiline (ülitundlik) mometasoonfuroaadi või Elocon'i mõne koostisosa suhtes.
- kui te olete ülitundlik teiste glükokortikosteroidide suhtes.
- kui teil on seentest või bakteritest põhjustatud nahapõletik.
- kui teil on viirusnakkus, näiteks herpes või vöötohatis.
- kui teil esineb suuümbruse dermatiit (haavandid suu ümbruses), akne või nahaatroofia.
- kui teil esineb vaksineerimisjärgne reaktsioon.

- kui teil on tuulerõuged.

Arst otsustab, kas te võite seda ravimit kasutada roosvistrikuga (*Acne rosacea*) korral.

Konsulteerige oma arstiga, kui teil on kahtlus mõne eelpool nimetatud seisundi suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Elocon

Kui arst ei ole teinud vastavaid korraldusi, ärge katke Elocon'iga määratud nahapinda kinni, ärge kasutage ravimit pikaajaliselt, ärge manustage ravimit suurtele nahapindadele, näole või nahavoltide piirkonda, nagu kaenlaalused või kubeme piirkond.

Hoiatusi tuleb eriti järgida laste ravimisel.

Alla 2-aastastele lastele tohib ravimit manustada ainult arsti ettekirjutusel.

Ravi ei tohi järsult katkestada. Konsulteerige arstiga lisainformatsiooni saamiseks.

Vältige ravimi sattumist silma.

Kui haigusnäht pole mõne päevaga taanduma hakanud või on halvenenud, konsulteerige arstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Informeerige arsti kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga.

Arst otsustab, kas võite ravimit kasutada raseduse ja rinnaga toitmise ajal.

3. KUIDAS ELOCON'I KASUTADA

Kasutage Elocon'i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaliselt määratakse kahjustatud nahale 1 kord ööpäevas õhuke kiht Elocon kreemi/salvi (hõõruda õrnalt naha sisse) või mõned tilgad Elocon nahalahust.

Kui arst ei ole teisiti soovitanud, ärge katkestage järsult pikka aega kestnud ravi.

Kui teil on tunne, et Elocon'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Elocon'i rohkem kui ette nähtud

Tänaeni ei ole Elocon'i kasutamisel üleannustamist kirjeldatud. Juhusliku üleannustamise, ravimi allaneelamise, või ravimi suust imendumise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Elocon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: kipitus, sügelus, naha õhenemine, nahal muutuvad nähtavaks väikesed veresooned, striiad (venitusjäljed või heledamad triibud nahal), erüteem (punetus), akne, naha värvumine punakaks või punakas-pruuniks, kontaktdermatiit.

Elocon'i (eriti nahalahuse) manustamisel võib tekkida põletus- ja ärritustunne.

Kui ravitav nahapind kaetakse tiheda sidemega ja/või manustatakse ravimit väga suurele nahapinnale pikaajaliselt, võivad tekkida teised kõrvaltoimed (süsteemsed ehk organismi üldised), mida ei ole loetletud. Sellisel juhul tuleb pöörduda arsti poole.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS ELOCON'I SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida külmkapis.

Kasutada 4 nädala jooksul pärast avamist.

Ärge kasutage Elocon'i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Elocon sisaldab:

Kreem:

- Toimeaine on mometasoonfuroaat. 1 gramm kreemi sisaldab 1 mg mometasoonfuroaati.
- Abiained on valge vaseliin, valge vaha, propüleenglükoolstearaat, stearüülalkohol ja cetareth-20, heksüleenglükool, titaandioksiid (E171), alumiiniumoktenüülsuktsinaat tärkliis, fosforhape, destilleeritud vesi.

Salv:

- Toimeaine on mometasoonfuroaat. 1 gramm salvi sisaldab 1 mg mometasoonfuroaati.
- Abiained on heksüleenglükool, valge vaha, propüleenglükoolstearaat, valge vaseliin, fosforhape, destilleeritud vesi.

Nahalahus:

- Toimeaine on mometasoonfuroaat. 1 gramm nahalahust sisaldab 1 mg mometasoonfuroaati.
- Abiained on isopropüülalkohol, hüdroksüpropüülselluloos, ühealuseline naatriumfosfaadi dihüdraat, propüleenglükool, fosforhape, destilleeritud vesi.

Kuidas Elocon välja näeb ja pakendi sisu

Kreem:

Valge kuni määrdunud valge ühtlane homogeenne kreem.

Salv:

Valge kuni määrdunud valge läbipaistmatu salv.

Nahalahus:

Värvitu kuni määratud valge nahalahus.

Elocon on saadaval järgmistes pakendites:

kreem, salv: 20 g või 50 g metalltuubis.

nahalahus: 20 ml või 50 ml plastikpudelis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Schering-Plough Europe

Rue de Stalle 73

B-1180 Bruxelles

Belgia

Tootja

Kreem ja salv:

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B2220 Heist-op-den-Berg, Belgia.

Nahalahus:

Schering-Plough S.p.A., Via F. Kennedy 5, I - 26833 Comazzo, Itaalia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Eesti

Järvevana tee 9

EE-11314 Tallinn

Tel: + 372 654 9686

Infoleht on viimati koostöölstatud: detsembris 2007